

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

1)Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı İlaçları (Geçerlilik tarihi 10.03.2011)

KOAH raporu çıkarılabilmesi için Solunum Fonksiyon Testi Yapılması ve FEV değerinin %80 ve altı olması ve raporda bu değerlerin belirtilmesi şartı getirildi.

2)Statinler (Geçerlilik tarihi 10.03.2011)

Statin grubu ilaçların son 6 ayda yapılan tetkik sonucu ile raporsuz olarak reçete edilebilmesi uygulaması sona erdi.

3) Gemfibrozil (LOPID) (Geçerlilik tarihi 10.03.2011)

Gemfibrozil (LOPID) trigliserid değeri 1000 üzeri hastalarda, raporda belirtilmek şartı ile Endokrinoloji uzmanının çıkardığı rapor ile yine endokrinoloji uzmanı tarafından 2*1 dozla reçetelenebilir.

4) Pregabalin (LYRICA), Zonisamit (EXCEGRAN) (Geçerlilik tarihi 10.03.2011)

Pregabalin ve zonisamit, nöroloji uzmanı tarafından veya bu uzman hekimce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

Nöroloji uzmanları raporsuz da yazabiliyor.

5)Parkinson Tedavisinde İlaç Kullanım İlkeleri(Geçerlilik tarihi 10.03.2011)

Amantadin sülfat (PK-MERZ); parkinson hastalığının tedavisi ile ilaçlara bağlı oluşmuş ekstrapiramidal reaksiyonların tedavisinde (tremor, rijidite, hipo veya akinezi), nöroloji uzmanı tarafından veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

Sağlık kurulu raporu koşulu kaldırıldı.

6)Huzursuz Bacak Sendromunda İlaç Kullanım İlkeleri (Geçerlilik tarihi 10.03.2011)

Pramipeksol hidroklorür (PEKSOLA) ve Ropinirol (REQUIP) etken maddelerini içeren ilaçlar; nöroloji veya psikiyatri uzman hekim tarafından veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.”

Nöroloji veya psikiyatri uzmanları tarafından reçetelendirilebilir, nöroloji veya psikiyatri uzmanlarının çıkardığı raporla tüm hekimler tarafından yazılabilir.

7)Diyabet Tedavisinde İlaç Kullanım İlkeleri (Geçerlilik tarihi 10.03.2011)

Repaglinid, Nateglinid ve diğer oral antidiyabetiklerin kombine preparatları; endokrinoloji, iç hastalıkları, kardiyoloji ve aile hekimliği uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Analjezik-insülinler, Bioglitazon, Bioglitazonun oral kombinasyonları veya Bioglitazonun insülin ile kombine kullanımları