

03.08.12 SUT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

1) LİPİT DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR (Yürürlük tarihi 04.08.2012)

a) STATİNLER

Statin grubu ilaçların geri ödenebilmesi ve rapor çıkarılabilmesi için yeni getirilen kurallardan biri **EK RİSK FAKTÖRLERİ** olup bunlar;

- **Hipertansiyon,**
 - **Ailede erken kardiyovasküler hastalık öyküsü**
 - **65 yaş ve üstü hastalar**
- olarak belirlenmiştir.

Statinler, **daha önce ilaç kullanmayan hastalarda** uzman hekim raporuna dayanılarak kullanılmaya başlanır.

LDL DEĞERLERİ	EK RİSK FAKTÖRLERİ
190 mg/dL nin üstünde olduğu durumlar	Risk faktörü aranmaz
160 mg/dL nin üstünde olduğu durumlar	2 Risk faktörü aranır
130 mg/dL nin üstünde olduğu durumlar	3 Risk faktörü aranır
100 mg/dL nin üstünde olduğu durumlar	Ancak Diabetes mellitus,Akut koroner sendrom,geçirilmiş MI,geçirilmiş infarktüsü,Koronar arter hastalığı,Abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda RİSK FAKTÖRÜNE gerek olmadan başlanır.(Bu durumda sadece 1 tane tetkik yeterlidir.)

TEDAVİYE BAŞLAMAYA ESAS OLAN İLK UZMAN HEKİM RAPORUNDA

Rapor öncesi son **6 ay içinde** 130,160 ve 190 mg/dL değerleri için **en az bir hafta ara ile 2 defa olmak üzere** kan lipid düzeylerinin her ikisinde de yüksek olduğunu gösteren tetkik sonuçları belirtilir. (**TETKİK SAYISI İKİYE ÇIKARILMIŞTIR.**)

Rapor süresi boyunca **tetkik sonuçları değerlendirilmeye alınmaz.**