

26.05.2015 Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.2.30.A maddesi hakkında

39.A.00.002015-2289

26.05.2015

BÜLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bizimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilen yazı ile, Sağlık Uygulama Tebliği'nin 44.2.30. A- Pulmoner hipertansiyonda iloprost trometamol (inhaler formu), bosentan, sildenafil, tadalafl ve ambrisentan kullanımı ile ilgili maddesinin a,b,c fkraları a'da'daki şekilde düzenlendiği,

- a) Fonksiyonel kapasite testinin NYHA sınıfları II, III veya IV olması?
- b) Vazoreaktifite testinin negatif olması?
- c) Üçüncü ayda tedavi sonrası kontrolünde klinik efor kapasitesi (5 dakika yürüme testi veya treadmill efor testi), hemodinami veya ekokardiyografik verilerinde düzelme olması? veya stabil kalması?, gerekmektedir.

Yeni tedavi konularak tedaviye başlayacak bir hasta için a ve b fkralarında belirtilen şartları sağlanmasa da mümkün gözüktükten, daha önce tedavi alınmış bir hasta için c fkrasında yer alan şartları sağlanmasa da mümkün olmadıkça değerlendirildiği, bu sebeple ilk defa tedavi alacak hastalar için uygulamaları nasıl olacak? hususunda görüş talep edilmektedir.

Kurum'dan gelen cevabı yazı ile, yeni tedavi konulan hastaların "a" ve "b" fkralarında belirtilen kriterleri sağlanmasa da halinde üç aylık tedaviye başlamaları mümkün oldu'nu, üç aylık tedavi sonrası tedaviye devam edebilmeleri için "c" fkrasında yer alan kriterleri sağlamaları gerektiği bildirilmektedir.

Kurumun yazıya ekte yer almakta olup, bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Kurum yazıya için ekliymiştir.